



BIOCLINIC

LABORATORIO MÉDICO

ESPECIALISTAS EN SALUD

Examen	NIVEL PLASMÁTICO OXCARBAZEPINA
Días para toma de muestras	LUNES A JUEVES
Instructivo de toma de muestra para paciente	Realizar aseo previo a la recolección de la muestra. HOMBRES: Abra el frasco, sin tocar los bordes. Retraiga el prepucio (piel que cubre el pene) y manténgalo así durante todo el procedimiento. MUJERES: Abra el frasco, sin tocar los bordes. Separe los labios mayores (genitales externos) con una de sus manos y manténgalos así. Luego comience a orinar y el primer chorro directamente en el frasco llenándolo aproximadamente la mitad de su capacidad y tapar. Evite contaminar la muestra y /o derramarla, sin tocar el frasco ni la tapa por su cara interna.
Días entrega de resultados	3 días hábiles
Instructivo de Preparación del paciente	Primera orina de la mañana de segundo chorro. Se debe tomar la muestra siempre previo aseo genital, con un volumen mínimo de 10ml de recolección. Se debe dar aviso en el caso de encontrarse en tratamiento con medicamentos como antibióticos, analgésicos, etc.
Instructivo de traslado	Coloque el frasco con la muestra en una bolsa y amárrela. Entregar en el laboratorio el mismo día de emitida la muestra.